

琥珀酸亚铁片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

【药品名称】

通用名称：琥珀酸亚铁片

英文名称：Ferrous Succinate Tablets

汉语拼音：Huposuanyatie Pian

【成份】本品每片含琥珀酸亚铁0.1克。

辅料为微晶纤维素、低取代羟丙纤维素、聚维酮K30、硬脂酸镁。

【性状】

本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显暗黄色。

【作用类别】本品为矿物质类非处方药药品。

【适应症】用于缺铁性贫血的预防和治疗。

【规格】0.1克

【用法用量】

口服。用于预防：成人一日1片，孕妇一日2片，儿童一日0.5片。用于治疗：成人一日2~4片，儿童一日1~3片，分次服用。

【不良反应】

1. 可见胃肠道不良反应，如恶心、呕吐、上腹痛、便秘。
2. 本品可减少肠蠕动，引起便秘，并排黑便。

【禁忌】

1. 肝肾功能严重损害，尤其是伴有未经治疗的尿路感染者禁用。
2. 铁负荷过高、血色病或含铁血黄素沉着症患者禁用。
3. 非缺铁性贫血（如地中海贫血）患者禁用。

【注意事项】

1. 用于日常补铁时，应采用预防量。
2. 治疗剂量不得长期使用，应在医师确诊为缺铁性贫血后使用，且治疗期间应定期检查血象和血清铁水平。
3. 下列情况慎用：酒精中毒、肝炎、急性感染、肠道炎症、胰腺炎、胃与十二指肠溃疡、溃疡性肠炎。
4. 本品不应与浓茶同服。
5. 本品宜在饭后或饭时服用，以减轻胃部刺激。
6. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 本品性状发生改变时禁止使用。

9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

10. 儿童必须在成人监护下使用。

11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 维生素C与本品同服，有利于本品吸收。
2. 本品与磷酸盐类、四环素类及鞣酸等同服，可妨碍铁的吸收。
3. 本品可减少左旋多巴、卡比多巴、甲基多巴及喹诺酮类药物的吸收。
4. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】铁是红细胞中血红蛋白的组成元素。缺铁时，红细胞合成血红蛋白量减少，致使红细胞体积变小，携氧能力下降，形成缺铁性贫血，口服本品可补充铁元素，纠正缺铁性贫血。

【贮藏】遮光，密封，在干燥处保存。

【包装】PVC硬片、铝箔泡罩包装。

12片/板×2板/盒。

【有效期】36个月。

【执行标准】国家食品药品监督管理局标准 YBH03002013

【批准文号】国药准字H20133230

【说明书修订日期】2020年08月01日

【药品上市许可持有人】

企业名称：湖南华纳大药厂股份有限公司

注册地址：湖南浏阳生物医药园区

【生产企业】

企业名称：湖南华纳大药厂股份有限公司

生产地址：湖南浏阳生物医药园区

邮政编码：410331

电话号码：0731-85910590

传真号码：0731-85910590

网 址：<http://www.warrant.com.cn>

如有问题可与生产企业联系